

Cebrary® Bladder Cancer Organoid Growth Medium (Human)

膀胱癌类器官生长培养基

产品简介

Cebrary® Bladder Cancer Organoid Growth Medium (Human) 膀胱癌类器官生长培养基是一种无血清可应用于细胞或组织来源的膀胱癌类器官的建立和长期培养过程，在细胞外基质存在的条件下，培养基所含特有组分及丰富的细胞因子能促使膀胱癌细胞迅速生长并形成膀胱癌类器官，类器官形成过程平稳且迅速，同时保持较高的膀胱癌细胞特性和活力，为后续基于膀胱癌类器官的生理功能、疾病研究和精准医学提供支持。

产品信息

货号	41440ES60 / 41440ES76
规格	100 mL / 500 mL

组分信息

组分名称	41440ES60	41440ES76
Cebrary® Bladder Cancer Organoid Growth Medium (Human) 膀胱癌类器官生长培养基	100 mL	500 mL

储存条件

2~8℃避光储存，有效期 3 月。

使用说明

人源膀胱癌原代培养

1. 标本离体后，尽快取材。采用无菌器械，保证无菌环境，将肿瘤组织放入含有 5 mL 的原代组织保存液的 15 mL 离心管中，4℃转运。
2. 在生物安全柜中取出样品管，去除组织保存液，加入 20 mL DPBS，摇晃清洗。更换 DPBS，重复清洗至液体澄清。
3. 去除 DPBS 缓冲液后，将组织块移至 10 cm 含 10 mL 冷原代组织保存液的无菌培养皿中，用无菌眼科显微剪将组织剪碎（直径约 0.5 mm -1 mm）。
4. 将组织转移至 50 mL 离心管内，加入 20 mL DPBS，重复清洗至液体澄清。
5. 收集组织碎片，加入组织消化液消化 20 - 30 min，加入 3 倍体积的 DPBS 终止消化，并使用移液器或者无菌一次性吸管吹打悬液至无明显组织块。
6. 反复吹打后过 70 μm 筛网，收集膀胱癌细胞。
7. 向组织消化的离心管内再次加入 20 mL DPBS，吹打后将细胞悬液再次经 100 μm 细胞筛网过滤至离心管内。
8. 4℃，300 g，离心 5 min，弃去上清，保留细胞沉淀。
9. 向沉淀中加入 1 mL DPBS 混匀，取合适体积混合液至细胞计数仪计数计算总细胞数量及活率。
10. DPBS 定容至 5 mL。4℃，300 g，离心 5 min，离心后弃上清。
11. 使用预冷的完全培养基将基质胶稀释到 70%。
12. 沉淀中加入稀释的基质胶，并调节至每微升基质胶含 100 - 1000 细胞/细胞团。

13. 吹打使类器官与基质胶混合，类器官基质胶混合液以 50 μL /孔滴加至 24 孔培养板孔中心。
14. 37°C、5% CO_2 培养箱中孵育 10 - 15 min。
15. 孵育结束每孔加入 500 μL 膀胱癌类器官培养基。
16. 37°C、5% CO_2 培养箱中继续培养，每 2 - 3 天更换一次新鲜培养基。
17. 类器官观察：每天观察类器官并拍照，了解初始类器官数量、增殖速度、形态、微生物污染情况等。

注意事项

1. 本产品仅作科研用途。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并佩戴一次性手套操作。
3. 产品的分装、使用等操作需在无菌环境下进行。